分光光度法测定红托竹荪中天然硒含量*

孙燕¹ 王玉珠¹ 陈宵¹ 龙汉武² 邹方伦² 潘高潮¹

(1 贵州省山地资源研究所, 贵州贵阳 550002;

2 贵州省生物研究所, 贵州贵阳 550009)

【摘要】: 硒含量检测在食品、医药研究等方面具有重要意义。目前报道对食用菌硒含量检测的有香菇、木耳、金针菇等多个品种, 方法较多, 但红托竹荪硒含量测定未见报道。采用分光光度法测定红托竹荪天然硒含量, 结果在 1.72mg/kg 左右, 超出富硒农产品地方性标准, 说明红托竹荪具有较强富硒能力。为红托竹荪富硒产品研究开发提供参考。

【关键词】: 红托竹荪, 分光光度法, 硒含量, 测定, 结果讨论

【中图分类号】: Q93-33 **【文献标识码】**: A **【文章编号】**: 1003-6563(2017)03-0019-04

硒是人体生命必需的微量元素, 有预防心血管疾病、抑制癌症、抗衰老等作用。硒具有敏锐的生物学效应, 安全域值较窄, 过高或过低都不利于健康, 因此有关硒含量的检测在现代食品营养分析、临床医学研究等方面具有十分重要的意义^[1]。食用菌在居民饮食中日益普及, 对其硒含量有较多研究^[7-21]。目前报道的食用菌硒含量测定中, 已包括香菇、木耳、金针菇等多个品种^[7-8]。但红托竹荪硒含量测定还未见报道。红托竹荪作为贵州特色食用真菌, 已经成为贵州食用菌主要栽培品种之一^[3-6], 探讨其硒含量具有重要实用价值。本文以“硝酸-高氯酸”湿法消解样品, 采用简便、快速的分光光度法, 对红托竹荪中的硒含量进行了测定, 并对测定结果进行了讨论。

1 实验仪器及材料

1.1 仪器

紫外可见分光光度计(ThermoND2000c 美国); 电子分析天平(DT100 北京光学仪器厂); 电热鼓风干燥箱; 电热板; 粉碎机。

1.2 样品

红托竹荪子实体(采自贵州红托竹荪原产地织金县)。

1.3 试剂材料(试剂均为分析纯, 所用水均为蒸馏水)

硝酸、高氯酸、盐酸、混合酸(硝酸与高氯酸按 9:1 体积混合)、氢氧化钠、乙二胺四乙酸二钠(EDTA-2Na)、二氨基联苯胺盐酸、硒、甲苯、PH 精密试纸。

2 操作步骤

2.1 硒标准储备液配制

称取 0.1000g 纯硒于 50mL 烧杯中，加入 10mL 1:1 硝酸溶液，加热使之溶解，冷却后移入 100mL 容量瓶中，用 1:9 硝酸溶液 (V 硝酸:V 水=1:9) 稀释至刻度，每毫升含有 1.0mg 硒。使用时用水稀释 1000 倍，每毫升含 1 μg 硒。

2.2 试样制备

2.2.1 预处理

样品用蒸馏水法洗去表面杂质，用干净纱布吸干表面水分，在 60℃ 干燥箱中烘干至恒重，在干燥器中冷却后，用粉碎机粉碎，储存在干燥器中备用。

2.2.2 消解

称取 2.0000g (精确至 0.001g) 试样，置于消化瓶中，加入 10.0mL 混合酸及几粒玻璃珠，盖上表面皿在排风处冷消化过夜。次日于电热板上加热，并及时补加硝酸。当溶液变为清亮无色并伴有白烟时，再继续加热，不蒸干。冷却后再加 5.0mL 盐酸，继续加热至溶液变为清亮无色并伴有白烟出现，此时六价硒还原成四价硒。冷却后加入 5mL 水转移至 25mL 容量瓶中，以水少量多次冲洗消化瓶，洗液并入容量瓶中，加水至刻度定容，混匀备用。同时做空白实验。

2.3 标准曲线配制

准确移取每毫升含有 1 μg 硒的标准溶液 0.0mL, 1.0mL, 3.0mL, 5.0mL, 7.0mL, 分别置于分液漏斗中，加水至 35mL, 分别加入 5%EDTA-2Na 溶液 1mL, 再各加 4mL 0.5% 二氨基联苯胺溶液，摇匀静置，然后滴加氢氧化钠至 PH 为中性，加入 10mL 甲苯振荡 2min, 静置分层。分别取上清液用分光光度计在 190nm—800nm 范围进行全波段扫描，于 419nm 处有最大吸收峰，选择 419nm 为工作波长，测其吸光值 A, 用空白作对照，重复 3 次，每次对应吸光值 A1、A2、A3, 取平均值，绘制标准曲线。

表 1 硒标准曲线测定结果 (A419)

Tab. 1 Results of selenium standard curve determination (A419)

标样 3 次	硒含量 / μg				
	0	1.0	3.0	5.0	7.0
A1	0	0.006	0.022	0.045	0.07
A2	0	0.005	0.021	0.045	0.07
A3	0	0.004	0.023	0.045	0.073
平均	0	0.005	0.022	0.045	0.071

从图 1 知，硒含量在 3 μg—8 μg 范围内，吸光值 A 与 Se(IV) 含量之间呈良好的线性关系，以 419nm 处的吸光值 A 对硒含量进行线性回归，得到回归方程为： $A=0.0123x-0.0153$ ， $R^2=0.9988$ 。

图1 硒标准曲线(A419)

Fig. 1 Selenium standard curve (A419)

2.4 硒含量测定

准确吸取相当于样品 2g 的消化液于分液漏斗中，加水至 35mL。加入 5%EDTA 溶液 1mL，摇匀，以下按标准曲线操作。

3 结果和讨论

3.1 结果

根据样品的吸光值，从标准曲线回归方程得出相当的硒含量，再按公式：

硒(mg/kg)=相当于标准的 μg 数/测定时相当于样品的重量(g)

计算出每千克单位红托竹荪的硒含量。

表2 样品硒含量测定结果(A419)

Tab. 2 Determination results of selenium content in samples (A419)

样品 3 次	A419	样品硒含量/μg	换算硒含量/(mg/kg)
S1	0.028	3.520	1.76
S2	0.026	3.358	1.68
S3	0.027	3.439	1.72
平均	0.027	3.439	1.72
相对标准偏差/%			2.36

为了考察结果的准确性,计算分光光度计3次测得结果相对标准偏差2.36%。重复测定2.0000g(精确至0.001g)试样,测定硒含量平均值是1.81mg/kg,两次独立测定结果的绝对差值0.09mg/kg,在0~0.177(两次独立测量均值的10%^[20])mg/kg范围内,所以精密度满足要求,该测量方法可靠。

3.2 讨论

实验测得红托竹荪天然硒含量在1.72mg/kg左右,超出富硒农产品地方性标准0.15mg/kg~1mg/kg^[21]范围,说明红托竹荪有较强的富硒能力。此结果可为红托竹荪富硒产品的研究与开发、提高红托竹荪市场竞争力提供参考。

参考文献【REFERENCES】

- [1] 陈亮,李桃. 元素硒与人体健康[J]. 微量元素与健康研究,2004,21(3):58-59.
- CHEN L, LI T. Element selenium and human body health [J]. Studies of Trace Element and Health, 2004, 21(3): 58-59.
- [2] 郭冬梅,蔺新英,邵丽华,等. 硒的生物功能及测定方法研究[J]. 微量元素与健康研究,2005,22(1):55-57.
- GUO D M, LIN X Y, SHAO L H, et al. Advances in studies on biological functions of selenium and its determination method [J]. Studies of Trace Element and Health, 2005, 22(1): 55-57.
- [3] 邹方伦. 贵州特色菌物和珍稀菌类的栽培与驯化研究[M]. 贵阳:贵州科技出版社,2007.
- [4] 潘高潮,龙汉武,何云松,等. 玉米秸秆栽培红托竹荪的推广研究[J]. 科学研究月刊,2013,67(4):63-65.
- [5] 潘高潮,邹方伦. 贵州红托竹荪化学成分研究[J]. 现代科学研究杂志,2013,41(7):62-66.
- [6] 何云松,龙汉武,潘高潮,等. 贵州红托竹荪菌种保藏方法及栽培研究[J]. 中国食用菌,2013,32(2):15-16+19.
- HE Y S, LONG H W, PAN G C, et al. Research on strains preservation methods and cultivation of dictyophora rubrovolvata in Guizhou [J]. Edible Fungi of China, 2013, 32(2): 15-16+19.
- [7] 梁英,张金艳. 荧光法测定食用菌中痕量硒[J]. 化学工程师,2001(2):42-44.
- LIANG Y, ZHANG J Y. The determination of selenium in edulis fungi by fluorescence spectrophotometry[J]. Chemical Engineer, 2001(2): 42-44.
- [8] 铁梅,臧树良,张崑,等. ICP-MS 测定食用菌中硒的方法研究[J]. 光谱学与光谱分析,2006,26(3):551-553.
- [9] 刘娟,焦华. 分光光度法测定大米中硒含量[J]. 光谱实验室,2012,29(4):2376-2379.
- LIU J, JIAO H. Determination of selenium content in rice by spectrophotometry[J]. Chinese Journal of spectroscopy

Laboratory, 2012, 29(4) : 2376-2379.

[10] 刘有芹, 王笑研. 大米中硒含量的测定 [J]. 广东微量元素科学, 2008, 15(3) : 41-45.

LIU Y Q, WANG X Y. Determination of selenium in rice [J]. Guangdong Trace Elements Science, 2008, 15(3) : 41-45.

[11] 胡庆兰, 齐俊文. 原子吸收光谱法测定调味品中微量金属元素 [J]. 湖北第二师范学院学报, 2015, 32(8) : 5-7.

HU Q L, QI J W. Determination of trace metals content in condiments by atomic absorption spectrometry [J]. Journal of Hubei University of Education, 2015, 32(8) : 5-7.

[12] 王安琪, 王新风, 洪媛, 等. 紫外分光光度法测定市售食用菌中硒含量 [J]. 淮阴师范学院学报(自然科学版), 2006, 5(2) : 143-145.

WANG A Q, WANG X F, HONG Y, et al. The determination of selenium in edible fungi by ultraviolet spectrophotometry [J]. Journal of Huaiyin Teachers College (Natural Science Edition), 2006, 5(2) : 143-145.

[13] 李富. 紫外分光光度法测定微量元素硒 [J]. 微量元素与健康研究, 1998, 15(1) : 56-62.

[14] 刘庆堂, 李瑞增, 李坚. 紫外分光光度法测定龙胆中微量元素硒 [J]. 广东药学, 2001, 11(6) : 30-32.

[15] 谢秀红, 李勇勤, 何淑贤. 紫外分光光度法测定当归中硒含量 [J]. 河北药学, 2000, 6(6) : 568-569.

[16] RAYMAN M P. The importance of selenium to human health [J]. The Lancet, 2000, 356(9) : 233 - 241.

[17] ROTRUCK J T, POPE A L, GANTHER H E, et al. Selenium:biochemical role as a component of glutathione peroxidase [J]. Science, 1973, 179(40) : 588 - 590.

[18] BECH M A. Selenium and host defense towards viruses [J]. Proceedings of the Nutrition Society, 1999, 58(3) : 707 - 711.

[19] CANN S A, VAN NETTEN J P, NETTEN C. Hypothesis iodine selenium and the development of breast cancer [J]. Cancer Causes Control, 2000, 11(2) : 121 - 127.